

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit homeopathische geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om CO-HYPERT SPAG. PEKANA® zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
- Vraag uw apotheek er om meer informatie of advies indien nodig.
- Raadpleeg een arts indien de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

CO-HYPERT SPAG. PEKANA®

Inhoud van deze bijsluiter

1. Wat is CO-HYPERT SPAG. PEKANA® en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat moet u weten, voordat u CO-HYPERT SPAG. PEKANA® gebruikt?
3. Hoe wordt CO-HYPERT SPAG. PEKANA® gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen.
5. Hoe bewaart u CO-HYPERT SPAG. PEKANA®?

Samenstelling van CO-HYPERT SPAG. PEKANA®

De bestanddelen per 100 gram druppels zijn:

Aurum muriaticum natronatum	D4	14,5 g
Baryta carbonica	D12	8,5 g
Cocculus indicus	D4	14,5 g
Iberis amara	D6	12,5 g
Magnesium muriaticum	D8	10,5 g
Sumbulus moschatus	D6	12,5 g
Melilotus officinalis spag.	D4	14,5 g
Viscum album spag.	D6	12,5 g

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: Ethanol, water.

Alcoholgehalte ca. 24% (v/v)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

PEKANA® Naturheilmittel GmbH,
Raiffeisenstrasse 15
D-88353 Kisslegg

Voor correspondentie en inlichtingen:

TIMM Health Care BV
Bosberg 41, 7271 LE Borculo
info@timmhealthcare.nl

In het register voor homeopathische farmaceutische producten ingeschreven onder RVH 91682

1. Wat is CO-HYPERT SPAG. PEKANA® en waarvoor wordt het gebruikt?

Toepassingen

CO-HYPERT SPAG. PEKANA® is een homeopathisch geneesmiddel zonder specifieke therapeutische indicatie toegepast volgens de principes van de homeopathische geneeswijze.

2. Wat moet u weten voordat u CO-HYPERT SPAG. PEKANA® gebruikt?

Wanneer mag u CO-HYPERT SPAG. PEKANA® niet gebruiken?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u CO-HYPERT SPAG. PEKANA® niet mag gebruiken.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met CO-HYPERT SPAG. PEKANA®?

Er zijn geen omstandigheden bekend waarbij u extra voorzichtig met CO-HYPERT SPAG. PEKANA® moet zijn.

Gebruik van CO-HYPERT SPAG. PEKANA® in combinatie met voedsel en drank

Gebruik CO-HYPERT SPAG. PEKANA® liever niet in combinatie met voedsel, maar bij voorkeur een half uur vóór, of een uur na de maaltijd.

Gebruik tijdens de zwangerschap en/of borstvoeding

Voor zover bekend kan dit homeopathische geneesmiddel zonder bezwaar worden gebruikt tijdens de zwangerschap en de periode van borstvoeding, overeenkomstig de aanbevolen dosering.

Rijvaardigheid en gebruik van machines

Gezien de lage dosering worden de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken naar verwachting niet beïnvloed.

Gebruik van CO-HYPERT SPAG. PEKANA® in combinatie met andere geneesmiddelen

Tot op heden zijn van dit geneesmiddel geen interacties met andere geneesmiddelen bekend.

3. Hoe wordt CO-HYPERT SPAG. PEKANA® ingenomen/gebruikt?

Dosering en gebruik

Tenzij anders voorgeschreven: Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: normaal 3 maal daags 10 druppels. Zo nodig om de 15 minuten, over een periode van maximaal 2 uur, 5 druppels.

CO-HYPERT SPAG. PEKANA® bij voorkeur een half uur voor of minstens één uur na de maaltijd innemen. De druppels kunnen onverdund of met een kleine hoeveelheid water vermengd ingenomen worden.

Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, dient een arts te worden geraadpleegd.

Wat moet u doen wanneer u te veel van CO-HYPERT SPAG. PEKANA® heeft ingenomen?

Volgens de homeopathie is het effect afhankelijk van het aantal potentiestappen en niet zozeer van de dosering. Ook bij een dubbele dosis zijn geen bijwerkingen te verwachten.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten CO-HYPERT SPAG. PEKANA® in te nemen?

Neem nooit een dubbele dosis van CO-HYPERT SPAG. PEKANA® om zo de vergeten dosis in te halen.

Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met CO-HYPERT SPAG.**PEKANA® wordt gestopt**

Bij het stoppen van de behandeling met CO-HYPERT SPAG. PEKANA® treden geen speciale verschijnselen op.

Speciale waarschuwingen en speciale voorzorgen bij gebruik

Het is bij homeopathische geneesmiddelen altijd mogelijk dat er een beginverergering optreedt in de eerste week van inname. Dit betekent dat de klachten in eerste instantie juist toenemen in plaats van afnemen. Stop in dit geval de inname van het middel en begin een paar dagen later met de halve dosering.

Dit middel bevat 45 mg alcohol (ethanol) per 10 druppels. De hoeveelheid per 10 druppels in dit middel komt overeen met minder dan 2 ml bier of 1 ml wijn.

Er zit een kleine hoeveelheid alcohol in dit middel. Dit is zo weinig dat u hier niets van merkt.

4. Mogelijke bijwerkingen

Er zijn van CO-HYPERT SPAG. PEKANA® geen bijwerkingen bekend.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u CO-HYPERT SPAG. PEKANA®?

Bewaren in de originele verpakking, beneden 25°C.

Na gebruik de verpakking onmiddellijk sluiten. Na opening van de flacon is de inhoud nog 6 maanden houdbaar.

CO-HYPERT SPAG. PEKANA® buiten bereik en zicht van kinderen houden!**Uiterste gebruiksdatum**

Gebruik CO-HYPERT SPAG. PEKANA® niet meer na de datum op de verpakking en het etiket achter "niet te gebruiken na" (de eerste twee cijfers duiden de maand aan, de vier volgende het jaartal).

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in 11-2021.